









Épocas de Tratamento da Oliveira

<div style="background-color: #92d050; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="background-color: #92d050; width: 50%; height: 50%; transform: rotate(45deg);"></div> <div style="background-color: #92d050; width: 50%; height: 50%; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;"> <p>Fases da Oliveira</p> <p>Problemas</p> </div> </div>										
Infestantes anuais (residual)	Zarpa (4 l/ha)								Zarpa (4 l/ha)	
Infestantes anuais ou vivazes (sistémico)	Targa Gold (anuais 1,5 l/ha; vivazes 3 l/ha) ⁽¹⁾ ou Roundup Ultra (anuais 2-4 l/ha; vivazes 4-10 l/ha) ou Roundup Forte (anuais 1-2 kg/ha; vivazes 2-5 kg/ha)									
Olho de pavão			Gafex (3 kg/ha) ⁽²⁾					Gafex (3 kg/ha) ⁽²⁾		
Gafa da azeitona							Gafex (3 kg/ha) ⁽²⁾			
Cochonilhas							Garbol (0,8-1,6 l/ha)			
Traça			Lebaycid ⁽³⁾ (100 ml/ha)			Lebaycid ⁽⁴⁾ (100 ml/ha)				
Mosca da azeitona							Lebaycid (100 ml/ha) ⁽⁵⁾			
Carência em boro			Foliarel (170 g/ha)							
Adubações foliares			Complezal 12-4-6 (600 ml/ha)			Cenfol (75-100 ml/ha) + Complezal 5-8-10 (600 ml/ha)				

⁽¹⁾Targa Gold: Herbicida sistémico para o controlo de gramíneas anuais, de preferência nos primeiros estados de desenvolvimento e gramíneas vivazes (ex. grama) em crescimento activo e antes da sua floração; ⁽²⁾ ou Cupravit (400-500 g/ha); ⁽³⁾ ou Dafenil (100 ml/ha); ⁽⁴⁾ ou Dafenil (150 ml/ha); ⁽⁵⁾ ou Decis (50 ml/ha) ou Dafenil (75-150 ml/ha).

Nota : Para desinfectar feridas de poda recomenda-se uma pasta de Gafex 1 kg/1 litro de água.